



...im Dezember ist die

## Vielblütige Bomarie (*Bomarea multiflora* (L. f.))

Familie Alstroemeriaceae  
(Inkaliliengewächse)

Die Vielblütige Bomarie ist eine Kletterpflanze, die in höheren Lagen der Anden in Südamerika, vor allem in nebelwäldern Kolumbiens und Ekuadors vorkommt. Die Blütenstände sind meist aus zahlreichen orangeroten Einzelblüten zusammengesetzt. Zwar sind die Blüten nicht besonders groß, aber bei genauerem Blick dafür besonders hübsch: die äußeren Blütenhüllblätter sind dunkler rot, die inneren gelb und zeigen dunkle Sprenkel auf der Innenseite. Typische Bestäuber im natürlichen Habitat sind Kolibris.

Die Vielblütige Bomarie ist sehr ausbreitungsfreudig und wüchsig, und in anderen Regionen der Welt, zu Beispiel in Neuseeland zu einem problematischen Neophyt geworden.

Die Gattung *Bomarea* enthält etwa 150 Arten, die vor allem in Gebirgen Südamerikas vorkommen. Dr. Anton Hofreiter, heute MdB für die Partei Bündnis 90/Die Grünen, hat in seiner Dissertation über diese Gattung gearbeitet. Insbesondere die Untergattungen *Wichuraea* und *Sphaerine* wurden von ihm revidiert.



Ein Blick in die Blüten im Botanischen garten Tübingen.



*Bomarea multiflora* am Naturstandort in Kolumbien; Foto: aus der Dissertation von A. Hofreiter, 2003.

